

## Desiclean Complex

- **Комплексный препарат для ухода за водой 3 в 1**
- **Дезинфектант, коагулянт и альгицид**

**Назначение:** Препарат предназначен для комплексной обработки воды в бассейне: дезинфекции, окисления органических соединений, предупреждения появления водорослей, осветления и очистки воды.

### Физико-химические показатели:

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА
Внешний вид	Белые таблетки с включениями синего цвета
Массовая доля действующего вещества, %, не менее	80
Показатель концентрации ионов водорода (1% раствор), рН, ед.	2,0-4,0
Масса одной таблетки, г	200±3

**Способ применения:** Препарат применять только в соответствии с его назначением, следуя этой инструкции. Препарат использовать при нейтральном уровне рН 7,0-7,4 при включенной системе фильтрации.

**Дозирование:** Препарат применяется из расчета одна таблетка (200 г) на 25 м<sup>3</sup> воды каждые 7-10 дней, с размещением в скиммер или в поплавок-дозатор при включенной системе фильтрации. Указанные дозы следует рассматривать как общие рекомендации и в конкретных случаях в зависимости от температуры воды, загрузки бассейна и др. дозы препарата следует увеличивать или уменьшать. Обязательно проверяйте тестером воду на необходимый уровень хлора. Нормальное количество свободного хлора должно составлять 0,3-0,6 мг/дм<sup>3</sup>. Содержание стабилизатора в воде не должно превышать 75 мг/дм<sup>3</sup>.

**Меры предосторожности:** Работы с препаратом проводить с использованием средств защиты кожи, глаз и органов дыхания. К работе с препаратом не допускаются лица младше 18 лет, лица с повышенной чувствительностью к хлорсодержащим соединениям. Следует избегать попадания препарата на кожу, в глаза и в желудок. Во время работ с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены, запрещается курить, пить и принимать пищу. После работы с препаратом лицо и руки следует вымыть водой с мылом.

**Меры первой помощи:** При нарушении мер безопасности при работе с препаратом возможно раздражение слизистых оболочек глаз и органов дыхания, покраснение и зуд кожи, головная боль. При появлении первых признаков отравления необходимо вывести пострадавшего из помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, прополоскать рот, горло, нос, дать стакан теплой воды с питьевой содой (чайная ложка на стакан) или молоко. Если препарат попал в глаза, их необходимо немедленно промыть проточной водой в течение 10-15 минут и в случае необходимости обратиться к врачу. При попадании препарата в желудок необходимо дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды и обязательно обратиться к врачу.

**Условия хранения:** Препарат хранить в крытом темном проветриваемом сухом помещении при температуре от 0 °С до плюс 30 °С, в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов. Срок хранения препарата в упаковке производителя - 24 месяца с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

**Упаковка:** 5 кг, 10 кг, 25 кг.