

Shock Chlor Tabs 20

- Дезинфицирующий препарат быстрого действия в таблетках со стабилизатором
- Стабилизирует уровень хлора в воде, не приводит к образованию осадков
- Эффективен против бактерий, грибов и вирусов, не влияет на уровень pH

Назначение: Препарат предназначен для шоковой и регулярной дезинфекции воды в бассейне. Эффективен против бактерий, вирусов и грибов.

Физико-химические показатели:

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА
Внешний вид	Таблетки белого цвета
Массовая доля действующего вещества, %, не менее	56
Показатель концентрации ионов водорода (1% раствор), pH, ед.	5,0-7,0
Масса одной таблетки, г	20±1,0

Способ применения: Препарат применять только в соответствии с его назначением, следуя этой инструкции. Препарат использовать при нейтральном уровне pH 7,0-7,4 при включенной системе фильтрации. Препарат предварительно растворяют в отдельной емкости и выливают в бассейн по периметру или кладут в скиммер.

Дозирование:

Первичная обработка: добавить в воду из расчета пять таблеток препарата на 10 м³ воды.

Следующее дозирование: при сбалансированном уровне pH добавлять две таблетки препарата на 10 м³ воды один раз в четыре дня. Указанные дозы следует рассматривать как общие рекомендации и в конкретных случаях в зависимости от температуры воды, загрузки бассейна и др. дозы препарата следует увеличивать или уменьшать. Обязательно проверяйте тестером воду на необходимый уровень хлора. Нормальное количество свободного хлора должно составлять 0,3-0,6 мг/дм³. Содержание стабилизатора в воде не должно превышать 75 мг/дм³.

Меры предосторожности: Работы с препаратом проводить с использованием средств защиты кожи, глаз и органов дыхания. К работе с препаратом не допускаются лица младше 18 лет, лица с повышенной чувствительностью к хлорсодержащим соединениям. Следует избегать попадания препарата на кожу, в глаза и в желудок. Во время работ с препаратом следует соблюдать правила личной гигиены, запрещается курить, пить и принимать пищу. После работы с препаратом лицо и руки следует вымыть водой с мылом.

Меры первой помощи: При нарушении мер безопасности при работе с препаратом возможно раздражение слизистых оболочек глаз и органов дыхания, покраснение и зуд кожи, головная боль. При появлении первых признаков отравления необходимо вывести пострадавшего из помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, прополоскать рот, горло, нос, дать стакан теплой воды с пищевой содой (чайная ложка на стакан) или молоко. Если препарат попал в глаза, их необходимо немедленно промыть проточной водой в течение 10-15 минут и в случае необходимости обратиться к врачу. При попадании препарата в желудок необходимо дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды и обязательно обратиться к врачу.

Условия хранения: Препарат хранить в закрытом темном проветриваемом сухом помещении при температуре от 0 °С до плюс 30 °С, в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов. Срок хранения препарата в упаковке - 24 месяца с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Упаковка: 4 кг, 8 кг, 25 кг.